

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/09/0012

**Bolfo** 4,442 g kakla siksna liela auguma suņiem

### 1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Bayer Animal Health GmbH  
51368 Leverkusen,  
Vācija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel,  
Vācija

### 2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

**Bolfo** 4,442 g kakla siksna liela auguma suņiem  
*Propoksūrs*

### 3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena 45 g kakla siksna satur:

**Aktīvā viela:**

Propoksūrs (2-izopropoksifenil-metilkarbamāts) 4,442 g

### 4. INDIKĀCIJAS

Blusu (*Ctenocephalides* spp.) un ērcu (*Ixodes ricinus*) invāzijas kontrolei suņiem.

Ārstnieciskā kakla siksna nepārtraukti izdala aktīvo vielu. Blusas tiek nogalinātas dažu stundu laikā no siksnas uzlikšanas brīža. Piestiprinājušās ērces tiek nogalinātas aptuveni vienas dienas laikā. Tās ir viegli noņemt, vai arī ērces pēkšņi nokrīt pašas.

Retos gadījumos ērcu piestiprināšanās var notikt kakla siksnas lietošanas laikā, bet tad tās tikai pieķeras ādai un atkrīt nost, parasti bez asiņu sūkšanas.

Aizsardzības ilgums pret blusām: līdz 4 mēnešiem.

Aizsardzības ilgums pret ērcēm: līdz 10 nedēļām.

### 5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot slimiem dzīvniekiem (jo īpaši, ja ir mehāniski gremošanas orgānu vai urīnizvadorgānu nosprostojumi, bronhiālā astma vai citas plaušu un asinsrites sistēmas slimības) vai dzīvniekiem atveseļošanās periodā.

Nelietot šīs veterinārās zāles arī:

- laktējošām kucēm,
- kucēm grūsnības beigu posmā,
- kucēniem, kuri jaunāki par 3 mēnešiem,

- dzīvniekiem, kuriem ir plaši ādas iekaisumi,
- dzīvniekiem, no kuriem iegūst produkciju cilvēku uzturam.

## **6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Ļoti jutīgiem dzīvniekiem var būt ādas kairinājums un nieze, jo īpaši pirmajās dienās pēc kakla siksnas uzlikšanas. Ja parādās šādi simptomi, kakla sikсна jānoņem, līdz simptomi izzūd. Nav nepieciešama specifiska ārstēšana.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

## **7. MĒRĶA SUGAS**

Suņi.

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES**

Kakla sikсна lietošanai ap kaklu.

Viena kakla sikсна katram dzīvniekam.

Izņemiet kakla siksnu no hermetizētā iepakojuma, atitiniet un noņemiet plastikāta loksni no siksnas iekšpuses. Aplieciet siksnu brīvi ap dzīvnieka kaklu un nogrieziet pāri palikušo lieko siksnas galu. Siksnu nedrīkst savilkt pārāk cieši (ieteicams, lai starp siksnu un kaklu var palikt divus pirkstus). Pirmajās dienās pēc siksnas uzlikšanas pārbaudiet dzīvnieka ādu kakla apvidū, jo dažiem dzīvniekiem siksnas nospiedums var izraisīt kairinājumu. Regulāri pārbaudiet kakla siksnas ciešumu.

Kakla siksnas efektivitātes ilgumu nosaka dzīvnieka apmatojuma garums un stāvoklis, dzīvnieka aktivitātes pakāpe un parazitāru invāzija. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu kakla siksnas efektivitāti, dzīvniekus ar raupju, savēlušu vai netīru apmatojumu vajadzētu nomazgāt ar šampūnu pirms kakla siksnas uzlikšanas. Ja kakla siksnas efektivitāte izbeigusies, tā jānomaina.

Dzīvnieka aprūpe var tikt turpināta kā parasti. Noņemiet kakla siksnu pirms dzīvnieka mazgāšanas un atkal aplieciet ap kaklu, kad apmatojums ir sauss. Bieža saskare ar ūdeni (lietus, peldēšanās, mazgāšana) var mazināt kakla siksnas efektivitāti.

Blusu invāzijas gadījumā visi mājssaimniecībā esošie dzīvnieki jāapstrādā ar piemērotu, reģistrētu insekticīdu.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Papildus blusām, kuras invadējušas suņus, arī apkārtnē var būt aptraipīta ar blusu oliņām, kāpuriem un kūniņām, kas var attīstīties par jaunām blusām. Lai pastiprinātu ārstēšanas efektivitāti, ieteicams mājdzīvnieku guļvietas, to tuvāko apkārtni un dzīvnieku iecienītās atpūtas vietas apstrādāt ar piemērotu insekticīdu vai insektu augšanas inhibitoru.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc "Derīgs līdz". Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

## 12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Bērniem jāizvairās no kontakta ar dzīvniekiem, kas valkā kakla siksnu.

Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un barības.

Neļaut rotaļāties ar kakla siksnu, sevišķi bērniem.

Neļaut sūkāt un košļāt kakla siksnu, sevišķi bērniem.

Izvairīties no kontakta ar acīm un ādu.

Nedzert, neēst vai nesmēķēt rīkojoties ar kakla siksnu.

Šīs veterinārās zāles satur karbamātu. Ja parādās saindēšanās pazīmes, lūdzu, meklējiet medicīnisko palīdzību.

### Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Kakla sikсна paredzēta ārīgai lietošanai kā insekticīds.

### Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Izvairīties no tiešas saskares ar acīm un ādu. Siksnas uzlikšanas laikā lietot cimdus. Lietošanas laikā izvairīties no pārmērīgas saskares ar kakla siksnu, un pēc pieskaršanās tai, rūpīgi nomazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni. Personām ar pastiprinātu jutību pret aktīvo vielu, propoksūru, vai kādu no palīgvielām, vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Nejaušas šīs kakla siksnas saskares gadījumā ar ādu, nekavējoties skalot skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens.

Ar *Bolfo* kakla siksnu nedrīkst darboties sievietes grūtniecības trešajā trimestrī.

Dzīvnieki, kuri valkā *Bolfo* kakla siksnu, nedrīkst atrasties kopā ar maziem bērniem un zīdaiņiem.

Šīs zāles ir ļoti toksiskas ūdenī dzīvojošiem organismiem, putniem un bitēm. Šīs zāles var izraisīt ilgstošu, nevēlamu iedarbību uz ūdens vidi.

Neļaut suņiem, kas valkā šo kakla siksnu, peldēties ūdenstilpnēs, jo tas var apdraudēt ūdenī dzīvojošus organismus.

Nelietot iepakojumu atkārtoti. Iznīcināt tukšo iepakojumu saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

## 13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Zāles nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem. Aktīvā viela propoksūrs ir toksiska ūdenī dzīvojošiem organismiem. Nepiesārņot ar veterinārajām zālēm vai to atkritumiem upes, ūdenstilpnes, ūdensteces, dambjus un citus ūdens avotus. Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm.

## 14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

12/2015

## 15. CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.